


INFORMACION GENERAL

Nombre producto: DORACUR	Composición: Cada 100 mL contiene:
Forma farmacéutica: Solución inyectable	Doramectina 1,0 g Excipientes c.s.p. 100,0 mL

DATOS CLÍNICOS

<p>Especies: Bovinos y Porcinos</p> 	<p>Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: Uso veterinario. Venta bajo receta médica y aplicación bajo orientación del Médico Veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Volúmenes de más de 5 mL preferiblemente deben dividirse en más de un sitio de aplicación. No lo guarde o aplique junto con alimentos, bebidas, productos de higiene y productos domésticos.</p>
<p>Indicaciones: En BOVINOS para el tratamiento y control de helmintos gastrointestinales (adultos y larvas de 4° estadio): <i>Ostertagia ostertagi</i>, <i>Haemonchus</i> spp, <i>Haemonchus contortus</i> (adultos), <i>Haemochos similis</i> (adultos), <i>Trichostrongylus axei</i>, <i>Trychongylus colubriformis</i>, <i>Cooperia punctata</i>, <i>Cooperia pectinata</i> (adultos), <i>Cooperia</i> spp, <i>Bunustomum phlebotomum</i> (adultos), <i>Oesophagostomum radiatum</i>, <i>Strongyloides papillosus</i> (adultos), <i>Trichuris</i> spp. (adultos). Helmintos pulmonares: <i>Dictyocaulus viviparus</i>. Garrapatas: <i>Rhipicephalus (Boophilus) microplus</i>. Larvas: <i>Dermatobia hominis</i>. Miasis (gusaneras cutáneas): Larvas de mosca <i>Cochilomyia hominivorax</i>. Piojos: <i>Linognathus vituli</i>, <i>Haematopinus eusysternus</i>, <i>Solonepotes capillatus</i> y <i>Damalinea bovis</i>. Acaros: <i>Psoroptes bovis</i>. En PORCINOS para el tratamiento y control de helmintos gastrointestinales (adultos y larvas de 4° estadio): <i>Hyostrogylus robidus</i>, <i>Ascaris suum</i>, <i>Strongyloides ransomi</i> (adultos), <i>Oesophagostomum dentatum</i>, <i>Trichuris suis</i>. Helmintos pulmonares: <i>Metastrongylus</i> spp. Helmintos renales (adultos): <i>Stephanurus dentatus</i>. Piojos: <i>Haematopinus suis</i>. Ácaros: <i>Sarcoptes scabiei</i>.</p>	<p>Dosis/Vía de administración: <u>Bovinos:</u> Administrar por vía subcutánea en la dosis de 1,0 mL por cada 50 kg de peso corporal (200 mcg de doramectina por kg de peso corporal). <u>Porcinos:</u> Administrar DORACUR® por vía intramuscular en la dosis de 1 mL para cada 33 kg de peso corporal (300 mcg de doramectina por kg de peso corporal).</p>
	<p>Tiempo de retiro: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano, hasta veintiocho (28) días después de finalizado el tratamiento. No administrar en bovinos cuya leche se destine a consumo humano. No administrar en terneros destinados para el consumo humano.</p>

INFORMACION FARMACÉUTICA

Lista de excipientes:

Oleato de etilo (butihidroxitolueno), aceite de sésamo - c.s.p 100 mL

Almacenamiento:

Conservar entre 10°C y 30°C, no exponerlo a la luz.

Vida útil:

36 meses.

Presentación:

Frasco vial en vidrio ámbar tipo III con tapón en goma bromobutílica (BIIR) por 50 mL o 500 mL.

TITULARIDAD

Titular / Información de contacto:

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia

Teléfono: 571 592 5050

Fabricante:

VALLÉE SA

Número Reg. ICA:

10549-MV

Fecha emisión:

1-jun-2020