


INFORMACION GENERAL

Nombre producto: Equilis Te	Composición: Cada dosis de 1 mL de toxoide contiene:
Forma farmacéutica: Suspensión inyectable	Toxoide tetánico 40 Lf** *50 AU: Unidades antigénicas **Lf: equivalentes de floculación (corresponde con ≥30 UI/mL).

DATOS CLÍNICOS

Especies: Equinos 	Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. No congelar. No deben ser vacunados animales enfermos.
Indicaciones: Para la inmunización activa de los caballos y ponies contra el tétanos. Aparición de la inmunidad: 2 semanas después de la vacunación primaria. Duración de la inmunidad: 17 meses después de la vacunación primaria. 24 meses después de la revacunación.	Dosis/Vía de administración: Inyección intramuscular de una dosis (1mL) por animal. Tétanos: <u>Programa de vacunación primario:</u> A todo caballo que no haya sido vacunado previamente se le deberán administrar dos vacunaciones de una dosis con un intervalo de 4 semanas entre sí. Los potros deben ser vacunados desde las 6 semanas de edad. Si la vacunación se lleva a cabo antes de los 6 meses de edad, se puede esperar una protección completa después de la tercera vacunación cinco meses después. <u>Revacunación:</u> La primera revacunación frente al tétanos se administra 5 o 17 meses después de la vacunación básica, posteriormente, se recomienda un intervalo máximo de dos años entre cada revacunación. <u>Vacuna de emergencia:</u> La vacuna puede ser utilizada conjuntamente con suero tetánico de Intervet para el tratamiento de caballos lesionados que no hayan sido inmunizados frente al tétanos. En ese caso, la primera dosis del programa de vacunación primario puede ser administrada conjuntamente con la dosis profiláctica adecuada de Suero Tetánico de Intervet en un lugar de inyección separado. La segunda dosis se puede administrar 4 semanas después, tal y como se ha explicado arriba. Se recomienda repetir la inmunización frente al tétanos después de 1 mes aproximadamente. Tiempo de retiro: Cero días.



INFORMACION FARMACEUTICA

Lista de excipientes: Saponina purificada, a-D-Lactosa monohidrato, Na ₂ HPO ₄ H ₂ O, KH ₂ HPO ₄ , NaCl, MgCl ₂ 6H ₂ O, CaCl ₂ 2H ₂ O	Almacenamiento: Almacenar entre 2 – 8°C.
Vida útil: 36 Meses	Presentación: Jeringa pre-llenada en vidrio tipo I unidosis, viales en vidrio tipo I unidosis. Caja de cartón por 10, 5 o 1 jeringa. Caja de cartón por 10 viales.

TITULARIDAD

Información de contacto/Importador: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	Titular/Fabricante Intervet International B.V. - Holanda	
	Número Reg. ICA: 9635 - BV	Fecha emisión: 13-Nov-2015

