


INFORMACION GENERAL

<p>Nombre producto: F VAX-MG</p>	<p>Composición: Cada dosis contiene <i>Mycoplasma gallisepticum</i> cepa F: 10⁶ UCC (Unidades de cambio de color)</p>
<p>Forma farmacéutica: Liofilizado</p>	

DATOS CLÍNICOS

<p>Especies: Aves</p> 	<p>Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: F VAX-MG no debe administrarse durante una semana antes ni una semana después de administrar vacunas vivas de Newcastle, Bronquitis o Laringotraqueítis, como tampoco durante 3 días antes y 7 días después de un tratamiento con oxitetraciclina, clortetraciclina y/o sulfonamida. Manténgase fuera del alcance de los niños. Lávese bien las manos después de haber usado la vacuna. No permita que los pavos entren en contacto con esta vacuna ni con pollas ya vacunadas. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Almacenar en refrigeración entre 2 - 7°C. NO CONGELAR.</p>
<p>Indicaciones: En pollas sanas de 9 o más semanas de edad, como ayuda en la prevención de signos clínicos asociados con la infección por <i>Mycoplasma gallisepticum</i>, para administrar por aspersión.</p>	<p>Dosis/Vía de administración: Aplicar por aspersión a pollas sanas de 9 o más semanas de edad, diluyendo un vial del producto en agua destilada mezclada con leche en polvo (30 g de leche por cada litro de agua). La aplicación adecuadas por aspersión se logra solamente usando un aspersor limpio que pueda emitir un rociado grueso. Use el método de aspersión solamente en establecimientos que puedan mantenerse cerrados durante la vacunación y por lo menos durante los 15 minutos siguientes. Idealmente las gotas del rociados deben ser gruesas, de un tamaño en promedio entre 40 y 50 micrones.</p> <p>Tiempo de retiro: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de la administración.</p>

INFORMACION FARMACEUTICA

<p>Lista de excipientes: Penicilina G, hidróxido de potasio, ácido l-glutámico, fosfato de potasio dibásico, fosfato de potasio monobásico, lactosa, N-Z amina tipo AS, agua purificada.</p>	<p>Almacenamiento: Almacenar entre 2 – 8°C.</p>
<p>Vida útil: 15 Meses</p>	<p>Presentación: Viales de vidrio tipo I por 1000 dosis. Termoformado por 10 frascos con 1000 Dosis.</p>



TITULARIDAD

Información de contacto/Importador:

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá,
Colombia

Teléfono: 571 592 5050

Titular/Fabricante

Intervet Inc. – Estados Unidos

Número Reg. ICA:

7099-BV

Fecha emisión:

23-Ene-2002

