


**INFORMACION GENERAL**

<b>Nombre producto:</b> Nobilis CAV P4	<b>Composición:</b>
<b>Forma farmacéutica:</b> Liofilizado	Cada dosis contiene al menos 3.0 log <sub>10</sub> TCID <sub>50</sub> de virus de anemia infecciosa, cepa CAV 26P4

**DATOS CLÍNICOS**

<b>Especies:</b> Aves 	<b>Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:</b> Vacunar las aves reproductoras no más tarde que 6 semanas antes de la supuesta fecha de comienzo de la puesta, a fin de garantizar que se desarrolla un nivel adecuado de anticuerpos. Lavar y desinfectar las manos y el equipo después de cada vacunación. Vacunar solo aves sanas. Utilizar la vacuna dentro de 4 horas después de abrir el vial. Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. Agitar bien antes de su aplicación. Conservar entre 2° y 8°C, no congelar. No utilizar en aves en postura ni durante las cuatro semanas antes de la postura.
<b>Indicaciones:</b> Para la inmunización de aves sanas contra la anemia aviar.	<b>Dosis/Vía de administración:</b> La vacuna se administrará a pollos de al menos 6 semanas de edad. Inyección: Reconstituir la vacuna en el diluyente, 200 ml por 1000 dosis y administrar 0,2 ml de vacuna por inyección intramuscular o subcutánea. Método Membrana del ala: Reconstituir la vacuna en el diluyente, 13 ml por 1000 dosis y puncionar la membrana del ala desde abajo. El momento y método de administración más indicados dependen en alto grado de la situación local. En relación con ello, hay que consultar a un veterinario. Vacunar las aves reproductoras no más tarde que 6 semanas antes de la supuesta fecha de comienzo de la puesta, a fin de garantizar que se desarrolla un nivel adecuado de anticuerpos. La vacunación con Nobilis CAV P4 puede combinarse con la Nobilis Reo 1133 (por vía intramuscular o subcutánea) o la vacuna de viruela aviar Nobilis Ovo-Diphtherin (por punción de la membrana del ala).
	<b>Tiempo de retiro:</b> No aplica.

**INFORMACION FARMACEUTICA**

<b>Lista de excipientes:</b> <b>Estabilizador:</b> Digerido pancreático de caseína, dextran 70, sorbitol, sacarosa, gelatina, fosfato de potasio dibásico, fosfato de potasio monobásico, sulfato de gentamicina, agua para inyección. <b>Diluyente (IM-SC):</b> Acetato DI- α tocoferol, polisorbato 80, fosfato de potasio monobásico, fosfato disódico dihidrato, cloruro de sodio, simeticona, agua para inyección. <b>Diluyente (membrana del ala):</b> sucrosa, fosfato de potasio monobásico, fosfato disódico dihidrato, cloruro de sodio, agua para inyección.	<b>Almacenamiento:</b> Almacenar entre 2 – 8°C.
<b>Vida útil:</b> 24 Meses	<b>Presentación:</b> Fascos de vidrio tipo I por 500, 1000, 2500, 5000 y 10.000 Dosis



**TITULARIDAD**

**Información de contacto/Importador:**

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá,  
Colombia

Teléfono: 571 592 5050

**Titular/Fabricante**

Intervet International BV - Holanda

**Número Reg. ICA:**

5628-DB

**Fecha emisión:**

06-Nov-2001

