


INFORMACION GENERAL

<p>Nombre producto: Nobivac RL</p>	<p>Composición: Cada dosis contiene:</p>
<p>Forma farmacéutica: Suspensión inyectable</p>	<p>Virus de rabia inactivado cepa Pasteur/RIV ≥ 3,0 UI <i>Leptospira interrogans serovar canicola</i> inactivada. ≥ 40 hamster DP₈₀ <i>Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae</i> inactivada. ≥ 40 hamster DP₈₀</p>

DATOS CLÍNICOS

<p>Especies: Caninos</p> 	<p>Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:</p> <p>Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. No congelar. Venta bajo fórmula del médico veterinario. Aplicar solo en animales sanos.</p>						
<p>Indicaciones:</p> <p>En perros para la inmunización activa contra <i>Leptospira interrogans serogrupos canicola</i> e <i>icterohaemorrhagiae</i> y rabia.</p>	<p>Dosis/Vía de administración:</p> <p>Aplicar una dosis (1 mL) vía subcutánea. La edad ideal para iniciar el plan vacunal contra la leptospira es a partir de la octava semana de edad y deben aplicarse al menos dos dosis con un intervalo aproximado de 2-4 semanas. En la fracción de rabia la primera vacunación debe realizarse a partir de la 12ª semana de edad.</p> <p>La combinación Nobivac RL brinda la oportunidad de realizar una inmunización completa contra la rabia y la leptospirosis a partir de la 12ª semana de vida, y ofrece la posibilidad de ser usada como reconstituyente de cualquiera de las vacunas liofilizadas NOBIVAC para perros.</p> <p>a. Pauta de vacunación para cachorros donde es necesario iniciar un plan vacunal temprano (4-6 semanas de edad)</p> <table border="1" data-bbox="503 1375 1510 1564"> <tr> <td>4-6 semana de vida</td> <td>Nobivac Puppy DP o Nobivac Parvo C</td> </tr> <tr> <td>8-9 semana de vida</td> <td>Nobivac DHP o Nobivac DHPPi con Nobivac L y con Nobivac Corona</td> </tr> <tr> <td>121 semana de vida</td> <td>Nobivac DHP o Nobivac DHPPi con Nobivac L o Nobivac RL y con Nobivac Corona</td> </tr> </table> <p>La vacunación contra rabia debe establecerse de acuerdo a las disposiciones legales.</p> <p>Tiempo de retiro: No aplica.</p>	4-6 semana de vida	Nobivac Puppy DP o Nobivac Parvo C	8-9 semana de vida	Nobivac DHP o Nobivac DHPPi con Nobivac L y con Nobivac Corona	121 semana de vida	Nobivac DHP o Nobivac DHPPi con Nobivac L o Nobivac RL y con Nobivac Corona
4-6 semana de vida	Nobivac Puppy DP o Nobivac Parvo C						
8-9 semana de vida	Nobivac DHP o Nobivac DHPPi con Nobivac L y con Nobivac Corona						
121 semana de vida	Nobivac DHP o Nobivac DHPPi con Nobivac L o Nobivac RL y con Nobivac Corona						



INFORMACION FARMACEUTICA

Lista de excipientes: Fosfato de aluminio 2%, Na ₂ HPO ₄ 2H ₂ O, NaH ₂ PO ₄ 2H ₂ O, timerosal (Preservante)	Almacenamiento: Almacenar entre 2 – 8°C.
Vida útil: 36 Meses	Presentación: Viales de vidrio tipo 1 de un mL y caja con 10 viales de 1 mL.

TITULARIDAD

Información de contacto/Importador: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, Colombia Teléfono: 571 592 5050	Titular/Fabricante Intervet International B.V. - Holanda	
	Número Reg. ICA: 7395-BV	Fecha emisión: 16-Jul-2007

