

INFORMACION GENERAL

Nombre producto: Stimovit Calcio	Composición:										
Forma farmacéutica: Solución	Cada 100 mL de solución inyectable contiene:										
	<table> <tr> <td>Gluconato de calcio monohidratado (aporte de Ca 101,831 mEq).</td> <td>22,83 g</td> </tr> <tr> <td>D-sacarato de calcio tetrahidratado (aporte de Ca 0,242 mEq).</td> <td>0,0387 g</td> </tr> <tr> <td>Lactato de calcio penta hidratado (aporte de Ca 19,657 mEq)</td> <td>3,03 g</td> </tr> <tr> <td>Hipofosfito de magnesio hexahidratado (aporte de Mg hexahidratado) (Aporte de P 76,23 mEq)</td> <td>2,00 g</td> </tr> <tr> <td>Dextrosa anhidra</td> <td>5,00 g</td> </tr> </table>	Gluconato de calcio monohidratado (aporte de Ca 101,831 mEq).	22,83 g	D-sacarato de calcio tetrahidratado (aporte de Ca 0,242 mEq).	0,0387 g	Lactato de calcio penta hidratado (aporte de Ca 19,657 mEq)	3,03 g	Hipofosfito de magnesio hexahidratado (aporte de Mg hexahidratado) (Aporte de P 76,23 mEq)	2,00 g	Dextrosa anhidra	5,00 g
Gluconato de calcio monohidratado (aporte de Ca 101,831 mEq).	22,83 g										
D-sacarato de calcio tetrahidratado (aporte de Ca 0,242 mEq).	0,0387 g										
Lactato de calcio penta hidratado (aporte de Ca 19,657 mEq)	3,03 g										
Hipofosfito de magnesio hexahidratado (aporte de Mg hexahidratado) (Aporte de P 76,23 mEq)	2,00 g										
Dextrosa anhidra	5,00 g										

DATOS CLÍNICOS

Especies: Bovinos, equinos y caprinos	Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:
	<p>Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Venta bajo fórmula del médico veterinario. No usar en animales con problemas cardiacos o con insuficiencia renal grave. No administre flujo continuo, administre lentamente cuando sea utilizado por vía endovenosa. Use todo el contenido de un frasco una vez abierto. No es recomendado guardar el producto para administración posterior. No mezcle el producto con antibióticos aminoglucósidos, tetraciclinas o sulfato de magnesio debido a incompatibilidad. Solamente utilice Stimovit Calcio de apariencia limpia, incolora o levemente amarillenta.</p>
Indicaciones: En bovinos, equinos y caprinos que estén presentando sintomatología clínica de deficiencias de calcio, fósforo y magnesio. Hipocalcemia posparto (paresia de la parturienta, fiebre vitular o fiebre de leche): síndrome de la vaca caída; Tetania de los pastos (hipomagnesemia).	Dosis/Vía de administración: La dosificación indicada para bovinos, equinos y caprinos es de 1 mL por kg de peso. Las vías de administración recomendadas por especie animal son: <ul style="list-style-type: none"> - Bovinos y caprinos: vía endovenosa o subcutánea. - Equinos: vía endovenosa. <p>En caso de administración subcutánea, el volumen máximo por sitio de aplicación es de 20 mL para bovinos y 5 mL para caprinos. Interrumpa la aplicación del producto una vez que se presente reversión del cuadro de hipocalcemia y/o decúbito del animal.</p>
	Tiempo de retiro: Ninguno.

INFORMACION FARMACEUTICA

Lista de excipientes: Alcohol bencílico, metilparabeno, propilparabeno, ácido bórico y agua para inyectables.	Almacenamiento: Almacenar entre 15 - 30°C, no exponerlo a la luz.
Vida útil: 24 Meses	Presentación: Frasco en polipropileno por 250 o 500 mL cerrado con tapón de caucho y cápsula de aluminio.



TITULARIDAD

Información de contacto/Importador:

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá,
Colombia

Teléfono: 571 592 5050

Titular/Fabricante:

Vallée S/A - Brasil

Número Reg. ICA:

10473-MV

Fecha emisión:

06-Nov-2019

