

INFORMACION GENERAL

Nombre producto:
Porcilis Ery+Parvo+Lepto

Composición:

Cada dosis de 2 mL de vacuna contiene cepas inactivadas de:

Forma farmacéutica:
Suspensión

- *Erysipelothrix rhusiopathiae* cepa M2 ≥ 1 ppd*
 - *Parvovirus porcino* cepa 014 ≥ 130 U*
 - *Leptospira interrogans* serovar *Canicola* ≥ 2816 U*
 - *Leptospira interrogans* serovar *Icterohaemorrhagiae* ≥ 210 U*
 - *Leptospira interrogans* serovar *Australis* ≥ 1310 U*
 - *Leptospira interrogans* serovar *Gryppotyphosa* ≥ 648 U*
 - *Leptospira interrogans* serovar *Pomona* ≥ 166 U*
 - *Leptospira interrogans* serovar *Tarassovi* ≥ 276 U*
- *Según se determina en el producto final mediante ELISA de masa antigénica

DATOS CLÍNICOS

Especies:
Porcinos



Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones:

Vacunar únicamente animales sanos. Agitar bien antes de usar. Evitar la introducción de contaminación. Periodo de validez después de abierto el recipiente: 10 horas. Conservar protegido de la luz a una temperatura de 2 a 8°C. No congelar. Proteger de la luz directa del sol. No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños y animales domésticos. Consulte al médico veterinario. Venta bajo fórmula del médico veterinario.

Indicaciones: Para la inmunización activa de cerdos contra problemas reproductivos causados por parvovirus porcino y *L. interrogans* serogrupo Pomona serovar Pomona. Para la reducción de los signos clínicos causados por *E. rhusiopathiae* y *L. interrogans* serogrupo Canicola y *L. interrogans* serogrupo Pomona serovar Pomona. Para reducir la infección causada por *L. interrogans* serogrupo Canicola serovar Canicola, *L. interrogans* serogrupo Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni e Icterohaemorrhagiae, *L. interrogans* serogrupo Australis serovar Bratislava, *L. interrogans* serogrupo Gryppotyphosa y Bananal/Lianguang y *L. interrogans* serogrupo Tarassovi serovar Vughia y Tarassovi. Para reducir la excreción por *L. interrogans* serogrupo Canicola serovar Canicola.

Dosis/Vía de administración:

Administrar una sola dosis de 2 ml a los cerdos mediante inyección intramuscular

* Programa de vacunación:

Esquema básico de vacunación

A los cerdos de los que aún no han sido vacunados se les dará un primario de 6 a 8 semanas antes de la fecha prevista de la inseminación y una segunda dosis 4 semanas más tarde.

Revacunación

Revacunar una vez al año, complementada con la aplicación de un producto que contenga *E. rhusiopathiae* 6 meses después para mantener la inmunidad contra este patógeno.

	Aparición inmunidad	Duración inmunidad
<i>E. rhusiopathiae</i>	3 semanas	6 meses
Parvovirus porcino	10 semanas	12 meses
Leptospira serogrupos	2 semanas	12 meses

Tiempo de retiro:

Cero días

INFORMACION FARMACEUTICA

Lista de excipientes:
(Polisorbato 80, simeticona, NaCl, KCl, KH₂PO₄, NaHPO₄.2H₂O y agua para inyección) c.s.p. 2 ml
Adyuvante: dl-α-tocopheryl acetato.

Almacenamiento:
Almacenar entre 2 – 8°C

Vida útil:
24 Meses

Presentación:
Fracos PEAD por 10, 50, 100 y 250 ml con 10, 25, 50 y 125 dosis respectivamente en plegadiza en carton.



PORCILIS ERY+PARVO+LEPTO
PRODUCTO BIOLÓGICO



TITULARIDAD

Información de contacto/Importador:

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá,
Colombia

Teléfono: 571 592 5050

Titular/Fabricante

Intervet International B.V. – Holanda

Número Reg. ICA:

9754-BV

Fecha emisión:

21-Jul-2016

Ficha técnica de producto

